

NESPĒĒ
PASLĒPES AR
PARAZĪTIEM!

No **GĀLVAS**
līdz **ASTEI**



PARŪPĒSIMIES PAR
SAVA MĀJDZĪVNIEKA
VESELĪBU

Satura rādītājs

Ievads	2
Satura rādītājs	3
Jauna pūkainā ģimenes locekļa sagaidāšana	4
Atbildīgs saimnieks.....	5
Kucēna dzīves notikumi (no dzimšanas līdz 6-9 mēnešiem).....	6
Kaķēna dzīves notikumi (no dzimšanas līdz 6-9 mēnešiem).....	7
10 svarīgākie ceļojuma piederumi Jūsu mājdzīvniekam	8
Pārtikas produkti, no kuriem jāizvairās	9
Biežāk sastopamie toksiskie augi	10
Košļājamās rotaļlietas.....	12
Pamatinformācija par parazītiem.....	14
Parazīti, kas dzīvo uz mūsu mājdzīvniekiem (ārējie parazīti).....	15
Blusas	16
Ganību ērces.....	19
Ērces	20
Ausu ērcītes	22
Demodētiskās kašķa ērces.....	24
Sarkoptiskās kašķa ērces (kašķis).....	26
Utis.....	28
Parazīti, kas dzīvo mūsu mājdzīvniekos (tārpi).	30
Āķtārpi.....	31
Apaļtārpi.....	32
Lenteņi	34
Matgalvji.....	36
Plaušu tārpi kaķiem	37
Plaušu tārpi suņiem	38
Sirdstārpi.....	40
Zemādas tārpi.....	42
Žirardija	43
Leišmanioze.....	44
Biežāk uzdotie jautājumi par parazītiem.....	46
Ieteikumi veiksmīgai aizsardzībai pret ērcēm un blusām ar Krka risinājumiem.....	48
Ieteikumi, lai atvieglotu Jūsu dzīvi, aizsardzībai pret iekšējiem parazītiem ar Krka tabletēm	49
Kā cīnīties ar mājdzīvnieka parazītiem?.....	50

Jaunā pūkainā ģimenes locekļa sagaidīšana

Darāmo darbu saraksts:

1. Pirms ierašanās sagādājiēt pirmās nepieciešamības preces.
2. Izvēlieties veterinārārstu (vakcinācija un aizsardzība pret parazītiem) un mājdzīvnieku skolu.
3. Ja iespējams, paņemiet 2 nedēļu atvaļinājumu, lai veiktu pamata apmācību un socializāciju.
4. Izveidojiet mājdzīvniekam drošu vidi:¹
 - Noslēpiet elektrības vadus un kabelus
 - Uzglabājiēt ķīmiskās vielas drošā vietā (žurku un gliemežu ēsmas, zāliena mēslojumu, antifrīzu, māsjsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, medikamentus u.c.)
 - Novērsiēt piekļuvi toksiskiem augiem
 - Izmetiēt visas izlietotās baterijas
 - Neļaujiēt piekļuvi bērnu rotaļlietām, grāmatām, tālvadības pultīm, drēbēm un apaviem
 - Uzglabājiēt atkritumus neaizniedzamās vietās
 - Novietojiēt cilvēkiem paredzēto ēdienu dzīvniekam nesasniedzamā vietā.

Iepirkumu saraksts ar nepieciešamajām precēm:

- ☐ Mājdzīvnieka pārvadāšanas būris vai ceļojuma siksna
- ☐ Gulta, vēlams, ar noņemamu, veļasmašīnā mazgājamu pārklāju
- ☐ Pastaigu piederumi: pavadas, apkakle vai suņu siksnas ar identifikācijas piekariņu, maisiņi izkārnījumiem
- ☐ Izturīgas barības un ūdens bļodas
- ☐ Košļājamās rotaļlietas
- ☐ Atbilstoša izmēra būris
- ☐ Vecumam atbilstoša barība
- ☐ Paklājiņi tualetes apmācībai
- ☐ Kopšanas piederumi



Atbildīgs saimnieks



Izvēlieties mājdzīvnieku, kas ir **piemērots jūsu mājoklim un dzīvesveidam**. Apņemieties uzturēt attiecības ar savu mīluli visu mūžu, jo atbildīgs saimnieks rūpējas par savu mīluli visu mūžu. Piemēram, vidēja lieluma sunim paredzamais dzīves ilgums ir 12,7 gadi, bet jauktas šķirnes kaķim - 11,12 gadi ².

Mājdzīvnieka saimniekam jāiegulda **laiks un nauda**.



Vakcinācija un mikročipēšana



Atbilstoša dzīvesvieta/gulvieta



Sabalansēts uzturs



Regulāra piekļuve ūdenim



Ikdienas āra fiziskās aktivitātes



Regulāras vizītes pie veterinārārsta



Apmācība un socializācija



Regulāra kopšana



Zobu higiēna



Regulāra parazītu profilakse



Mājdzīvnieka izkārnījumu sakopšana

Katram suņa un kaķa saimniekam ir jāzina **pamatinformācija par izplatītākajiem parazītiem** un to profilaksi, lai saglabātu savu mīluli veselu.



Kucēna dzīves notikumi (no dzimšanas līdz 6-9 mēnešiem)

Dažādas suņu šķirnes noveco atšķirīgi ātri

No 2 nedēļu vecuma regulāra

AIZSARDZĪBA PRET PARAZĪTIEM

2-3 nedēļu vecumā

SPĒJA REDZĒT

3 nedēļu vecumā

SPĒJA DZIRDĒT

Aptuveni 6 nedēļu vecumā

VISI 26 PASTĀVĪGIE ZOBĪ

6-8 nedēļu vecumā

**VAKCINĀCIJA PRET INFEKCIJAS
SLIMĪBĀM (pirmā)**

Līdz 3 mēnešu vecumam

8 nedēļu vecumā

JAUNA MĀJA

**MIKROČIPĒŠANA UN
REĢISTRĒŠANA, LAI SAŅEMTU
EIROPAS SAVIENĪBAS PASI**

12 nedēļu vecumā

**VAKCINĀCIJA PRET INFEKCIJAS
SLIMĪBĀM (otrā)**

12-16 nedēļu vecumā

VAKCINĀCIJA PRET TRAKUMSĒRGU

16 nedēļu vecumā

**VAKCINĀCIJA PRET INFEKCIJAS
SLIMĪBĀM (trešā)**

Pēc 16 nedēļu vecuma

SUŅU SKOLA

Līdz 7 mēnešu vecumam

VISI 42 PASTĀVĪGIE ZOBĪ

**Pastiprinošā vakcinācija pret
infekcijas slimībām:**

1 gadu pēc pēdējās vakcinācijas, pēc
tam ik pēc 3 gadiem.

**Pastiprinošā vakcinācija pret
trakumsērgu (obligāta saskaņā ar
likumu):**

- 1 gadu pēc pirmās vakcinācijas
- 1 gadu pēc otrās vakcinācijas
- Ik pēc 3 gadiem



Kaķēna dzīves notikumi (no dzimšanas līdz 6-9 mēnešiem)

Dažādas kaķu šķirnes noveco atšķirīgi ātri

No 3 nedēļu vecuma regulāra

AIZSARDZĪBA PRET PARAZĪTIEM

2-3 nedēļu vecumā

SPĒJA REDZĒT

3 nedēļu vecumā

SPĒJA DZIRDĒT

Aptuveni 7 nedēļu vecumā

VISI 28 PASTĀVĪGIE ZOBĪ

6-8 nedēļu vecumā

**VAKCINĀCIJA PRET INFEKCIJAS
SLIMĪBĀM (pirmā)**

Līdz 3 mēnešu vecumam

12 nedēļu vecumā

JAUNA MĀJA

**MIKROČIPĒŠANA UN
REĢISTRĒŠANA, LAI SAŅEMTU
EIROPAS SAVIENĪBAS PASI**

12 nedēļu vecumā

**VAKCINĀCIJA PRET INFEKCIJAS
SLIMĪBĀM (otrā)**

12-16 nedēļu vecumā

VAKCINĀCIJA PRET TRAKUMSĒRGU

16 nedēļu vecumā

**VAKCINĀCIJA PRET INFEKCIJAS
SLIMĪBĀM (trešā)**

Līdz 7 mēnešu vecumam

VISI 30 PASTĀVĪGIE ZOBĪ

**Pastiprinošā vakcinācija pret
infekcijas slimībām:**

1 gadu pēc pēdējās vakcinācijas, pēc
tam ik pēc 3 gadiem.

**Pastiprinošā vakcinācija pret
trakumsērgu (pēc izvēles):**

- 1 gadu pēc pirmās vakcinācijas
- 1 gadu pēc otrās vakcinācijas
- Ik pēc 3 gadiem

10 svarīgākie ceļojuma piederumi Jūsu mājdzīvniekam



Dokumentu kārtošana (vakcinācija, pase)	✓	✓
Kakla sikсна un pavada	✓	✓
Būris mājdzīvnieka pārvadāšanai	✗	✓
Identifikācijas medaļjons	✓	✓
Ēdieni un bļodas	✓	✓
Kārumi	✓	✓
Kaķumētra	✗	✓
Kastīte un liekšķere	✗	✓
Maisiņi izkārnījumiem	✓	✗
Pirmās palīdzības komplekts*	✓	✓
Rotaļlietas	✓	✓
Sega vai gulta	✓	✓
Kopšanas līdzekļi	✓	✓



* Pirmās palīdzības komplekts:

Marle • Pārsēji • Līmlente • Fizioloģiskais šķīdums • Termometrs
Šķēres • Pincete • Cimdi • Probiotikas vai līdzekļi pret caureju

Pārtikas produkti, no kuriem jāizvairās³



Vīnogas un
rozīnes



Piens
un piena
produkti



Rieksti (īpaši
makadāmijas
rieksti)



Šokolāde



Avokado



Rabarberi



Cilvēkiem
paredzētās
sāļās
uzkodas



Rauga mīkla



Sīpoli, ķiploki



Sēnes



Tauku
atgriežumi un
vārīti kauli



Augļu sēklas
vai kauliņi



Cukuroti
pārtikas
produkti un
dzērieni



Kofeīnu
sāturoši
produkti



Košļājamā
gumija
(ksilīts)



Alkoholiskie
dzērieni



Cilvēkiem
paredzētās
zāles
(paracetamols,
ibuprofēns u. c.)

Biežāk sastopamie toksiskie augi⁴



Alokāzija



Begonija



Puansetijas



Alveja



Amarillis,
hiacintes,
gladiolas



Ilekss



Īve



Rudens
krokusi



Acālija,
rododendrs



Naudas koks



Efeja



Zirgu kastaņi



Rīcins



Dīfenbahija



Krizantēmas



Monsteras



Ciklamena



Tulpes,
narcises



Uzmanīgi!



Eikalipts



Dracēna



Āmulis



Oleandrs



Fikuss



Lilijas



Kalādijas



Velna efejas



Svītrainā
sansevjēra



Sago palma



Suņstobrs



Zīles



Marihuāna



Flamingo
augš



Plūškoks

Košļājamās rotaļlietas

"DROŠAS" UN "NEDROŠAS"

Drošas košļājamās rotaļlietas:

-  No cietas gumijas izgatavotas bumbiņas un košļājamās rotaļlietas.
-  Plastmasas rotaļlietas bez svina, BPA* un viegliem ftalātiem.
-  Pārtikas puzzle.
-  Pildītas rotaļlietas, ja tās nav bojātas.

Bīstamas košļājamās rotaļlietas:

-  Tenisa bumbiņas var sabojāt zobu virsmu.
-  Virves, auklas, lentes u.c. var bojāt zarnas, ja tās tiek norītas. **Tas attiecas arī uz kaķiem.**
-  Ragi - cieti un var bojāt zobu virsmu.⁵
-  Vārti kauli var izraisīt zarnu nosprostojumus, kā arī šķembas var izraisīt smagus zarnu bojājumus.
-  Koka nūjas var ievainot suņa muti vai gremošanas sistēmu, ja tos norij.

* BPA - Bisfenols A



Svarīgi:

- **Vienmēr izņemiet bojātās rotaļlietas**, lai pasargātu Jūsu mīluli no jebkādu vaļējo daļiņu norīšanas.
- Veiciet rotaļlietu rotāciju, lai Jūsu mīlulim būtu interesanti.
- Neļaujiet mājdzīvniekam karāties pie rotaļlietas.
- Mazas rotaļlietas var norīt vai iestrēgt mutē. Pastāv aizrīšanās risks!



Pamatinformācija par parazītiem



- Parazīti ir sastopami **visu gadu**.
- **Vairāk nekā 60%** no visbiežāk sastopamajiem mājdzīvnieku parazītiem ir bīstami arī Jums.
- Daudzas invāzijas **paliek nepamanītas**.
- Visu izplatīto parazītu invāziju **var viegli novērst**.
- Parazīti pieder pie divām grupām: **ārējie** parazīti un **iekšējie** parazīti.

Kā pasargāt savu mājdzīvnieku no parazītiem?

- Regulāri ārstējiet visus mājdzīvniekus.
- Sakopiet sava mājdzīvnieka izkārnījumus.
- Novērojiet slimības pazīmes.
- Nosedziet smilšu kastes.
- Regulāri tīriet suņa gultasvietu, segas un barības bļodas.
- Regulāri dezinficējiet pakaišu kastes.
- Mazgājiet rokas.

VAI JŪS ZINĀJĀT?

1 no 4
kaķiem ir tārpi.




Parazīti, kas dzīvo uz mūsu mājdzīvniekiem (ārējie parazīti)

Visbiežāk sastopamie ārējie parazīti ir:

- Blusas
- Ērces
- Ausu ērcītes
- Demodētiskās kašķa ērces
- Sarkoptiskās kašķa ērces
- Utis

Ārējie parazīti, kas rada risku cilvēkiem:

- Blusas
- Ērces
- Sarkoptiskās kašķa ērces



Blusas



Pamatinformācija:

- Arī truši, seski, jūscūciņas, kāmjī, šinšillas, žurkas un peles var inficēties ar blusām.
- Katra blusa dienā izdēj no 10 līdz 50 oliņām, un visā dzīves laikā to skaits var sasniegt pat **vairākus tūkstošus**, kas no mājdzīvnieka nokļūst Jūsu mājās.
- **95% blusu dzīvo Jūsu mājās** (paklājos, gultas veļā, zem mēbelēm un grīdlīstēm, kā arī ēnainās pagalma vietās), nevis uz Jūsu mājdzīvnieka.
- Ja mājdzīvnieks norij blusas kopšanas laikā, tas var inficēties/invadēt **plakantārpu**.
- **Alerģija** pret blusu kodumiem ir visbiežāk sastopamais mājdzīvnieku niezes iemesls.
- Blusas var **izplatīt slimības** mājdzīvniekiem un cilvēkiem.

Kur Jūsu mājdzīvnieks var iegūt blusas?

- Invadēti savvaļas dzīvnieki un klaiņojoši dzīvnieki, kas ienes blusu olas pagalmā.
- Invadētas koplietošanas telpas (dienas aprūpes centri, suņu parki, suņu frizētavas, veterinārās klīnikas, audzētavas).
- Invadētas drēbes, apavi un četrkājainie viesi.

VAI ZINĀJĀT?

Blusas, ko redzat, ir tikai
līdz 5%
no visas blusu populācijas.




Dzīves cikls⁶


Pieaugušas blusas dzīvo uz saimniekiem un barojas ar asinīm.



Blusas rada vidēji 20 olas dienā, kas nonāk vidē.



No olām izšķīlušas kāpuri un paslēpjas no gaismas. Kūniņas kļūst par kāpuriem.



Kūniņas var gaidīt saimnieku pat 6 mēnešus.




95% blusu dzīvo Jūsu mājās (paklājos, gultas veļā, zem mēbelēm un grīdlīstēm, kā arī ēnainās pagalma vietās), nevis uz Jūsu mājdzīvnieka.



Kā zināt, vai Jūsu mājdzīvniekam ir blusas?

Jūs ne vienmēr varat atrast blusas vai to kodumus, tāpēc pievērsiet uzmanību citām pazīmēm!

- Melniem pipariem līdzīgi plankumi kažokā, īpaši pie astes pamatnes.
- Kasišanās vairāk nekā parasti
- Pārmērīga sevis kopšana (košana, laižšana, košļāšana)
- Matu izkrišana ap asti, cirkšņu zonā un iekšējo augšstilbu daļā
- Sarkanās pumpas vai kreveles
- Anēmija smagu infekciju gadījumā (vājums, bālas smaganas, paātrināta elpošana)



Ārstēšana:

- **Visus mājdzīvniekus** vienā mājsaimniecībā **ārstējiet** vienlaicīgi vismaz **3 mēnešus pēc kārtas**.
- Vismaz **reizi divās dienās, 3-8 nedēļas pēc kārtas, ar putekļu sūcēju** tīriet grīdas, paklājus, grīdsegas, mēbeles un visas auduma virsmas automašīnā. Pēc katras lietošanas reizes mainiet putekļu sūcēja maisiņu.
- **Visu gultas veļu un citu veļu**, piemēram, segas, drēbes un aizkarus, **mazgājiet** karstā ūdenī, vēlams **60°C** temperatūrā.
- **Mazgājiet visas mājdzīvnieka mīkstās rotaļlietas** karstā ūdenī vai ievietojiet tās maisiņā un ielieciet saldētavā.



Profilakse:

Aizsargājiet savu mīluli visu gadu, jo blusas var dzīvot telpās arī ziemā.

Ataxxa® **FYPRYST®**
combo



Ganību ērces



Pamatinformācija:

- Sarkani oranžās krāsas dēļ tos dēvē arī par sarkanajiem kukaiņiem.
- Tikai viena kāpura stadija barojas no dzīvniekiem, pārējās dzīvo vidē.
- Visbiežāk sastopamas no jūlija līdz novembrim.

Kur mājdzīvnieki var iegūt ērces?

- No saskares ar invadētu vidi, piemēram, zālainu lauku, dārzu, mežiem, lapām utt.

Ko mājdzīvniekiem izraisa ērces?

Tie caurdur ādu un injicē fermentus, kas sagrauj ādas šūnas, izraisot spēcīgu niezi. Dzīvnieki mēdz sevi košļāt un skrāpēt, kā rezultātā var novērot:

- matu izkrišanu;
- sarkanu, iekaisušu, nelīdzenu ādu.

Ko darīt, lai Jūsu mājdzīvniekam novērstu niezi?

- Ārstējiet savu mīluli vismaz vienu reizi mēnesī.
- Jūtīgākiem mājdzīvniekiem veterinārārsts izraksta pretiekaisuma līdzekļus, lai nomierinātu ādu.
- Ja ir infekcija, veterinārārsts var izrakstīt antibiotikas.

VAI ZINĀJĀT?

Cilvēki var inficēties ar ērcēm arī no apkārtējās vides.



Ērces



Pamatinformācija:

- Slimības izplatās **ērces piesūkšanās** rezultātā un parasti attīstās dažas **nedēļas vai mēnešus** pēc piesūkšanās.
- Slimības neizplatās starp suņiem vai no suņiem uz cilvēkiem.
- Lai pārnestu slimību, ērcei ir jābūt **piestiprinātai** vidēji **vismaz 24 stundas**.

VAI ZINĀJĀT?



Ērcēm nepieciešama
asins maltīte,
lai pabeigtu katru savu
dzīves posmu.

Ērces ir grūti pamanīt, jo mājdzīvniekiem nav nekādu acīmredzamu pazīmju, bet jūs varat ievērot:

- Pastiprināta košana noteiktā ķermeņa daļā.
- Nelieli ādas izciļņi (sākotnēji ne lielāki par adatas galviņu).
- Sarkana, iekaisusi āda.
- Ērču slimības simptomi: drudzis, apetītes zudums, nogurums, pietūkušas un sāpīgas locītavas, tumšs urīns, klībošana.



Ja domājat, ka Jūsu mājdzīvnieks slimo ar ērču pārnēsātu slimību, ir svarīgi vērsties pie veterinārārsta.

Riska faktori:

- Piekļuve meža vai zāliena platībām.
- Biežāk sastopamas pavasarī un rudenī.
- Neparedzami laikapstākļi, kas nozīmē, ka pavasarī ērces ir aktīvas ātrāk un rudenī - ilgāk.
- Spēj izdzīvot aukstumā un pat zem sniega.

Profilakse un ārstēšana:

- **Regulāri veiciet ērču pārbaudes visā ķermenī,** garspalvainiem suņiem izmantojot fēnu.
- **Nekavējoties noņemiet** piesūkušās ērces.
- Ērču **atbaidīšanas līdzekļi** ir labākais veids, kā pasargāt no ērču piesūkšanās.

Kā noņemt ērci no mājdzīvnieka?

- Uzgērbiet cimds un turiet savu mīluļi nekustīgu.
- Uzmanīgi pieglaudiet suņa kažoku ap ērci un ar vienu roku turiet to līdzenu.
- Lēnām pabīdīet ērču noņemēju vai ērču āķi zem ērces, viegli pagriežot un vienmērīgi virzoties taisni uz augšu, lai noņemtu ērci (pārbaudiet, vai noņemta ir visa ērce).
- Notveriet un nogaliniet ērci.
- Apstrādājiet koduma vietu ar mājdzīvniekiem draudzīgu antiseptisku līdzekli un nomazgājiet rokas.



Nekad nespiediet ērci, nelietojiet nagu laku vai vazelīnu un nemēģiniet to sadedzināt.



Ataxxa®
Šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem
 **NEDRĪKST LIETOT KAĶIEM!**

FYPRYST®
combo

Ausu ērcītes





Pamatinformācija:

- Parazīti, kas barojas ar vasku un eļļu Jūsu mīluļa ausīs.
- Ļoti viegli var invadēt citiem kaķiem un suņiem.
- Kaķi inficējas biežāk nekā suņi.
- Bieži sastopama kaķēniem un kucēniem.

Kā mājdzīvnieki iegūst ausu ērcītes?

- Gul vai spēlējas ar citiem mājdzīvniekiem.
- Saskare ar inficētu kopšanas aprīkojumu, birstēm, būriem un pat rotaļlietām.
- Saskare ar klaiņojošiem kaķiem vai inficētiem savvaļas dzīvniekiem, piemēram, lapsām.



Kā Jūs varat noteikt vai mājdzīvniekam ir ausu ērcītes?

- Skrāpējumi ap ausīm, galvu un kaklu.
- Galvas kratīšana.
- Tumši un vaskveida izdalījumi no ausīm (atgādina kafijas biezumus).
- Nepatīkama smaka no ausīm.
- Pārmērīgas skrāpēšanas dēļ veidojas asins kabatas (hematoma).
- Var rasties sekundāras bakteriālas vai sēnīšu infekcijas.

Kā atbrīvoties no ausu ērcītēm?

- Jāārstē visi mājdzīvniecībā esošie dzīvnieki vienlaicīgi.
- Rūpīgi iztīriet un apstrādājat mājdzīvnieka ausis.
- Mazgājiet mājdzīvnieka gulvietu, rotaļlietas, būrus, ķemmes karstā ūdenī.
- Izsūciet putekļus vietās, kur mājdzīvnieki pavada daudz laika, un izmetiet putekļu sūcēja maisiņu.

VAI ZINĀJĀT?

Kaķi var zaudēt

dzirdi ausu ērcu invāzijas rezultātā.




Demodektiskās kašķu ērces



Pamatinformācija:

- Galvenokārt skar suņus
- Uzturas matu folikulos
- Parasti sastopami nelielā skaitā uz visiem suņiem
- Var signalizēt par veselības stāvokli



Ir 2 slimības formas: lokalizēta un ģeneralizēta forma.

- **Lokalizēta:** jauniem suņiem (parasti līdz 6 mēnešu vecumam) kā zvīņveida ādas plankumi un apsārtums ap acīm un muti, dažreiz arī uz kājām un astes.
- **Ģeneralizēta:** plaši izplatīti apsārtuma plankumi, matu izkrišana un zvīņveidīga, sabiezējusi āda.

Kā un kāpēc suņi slimo ar demodektisko kašķi?

- Ērces tiek pārnestas kucēniem no mātes pirmajās dzīves dienās.
- Ja suņa imūnsistēma nedarbojas pareizi, piemēram, endoparazītisma vai nepietiekama uztura dēļ, ērcu skaits strauji palielinās.
- Vājas imūnsistēmas un liela ērcu skaita dēļ var sākties matu izkrišana.

Ārstēšana:

- Ārstējiet savu mīluļi pret kašķi ar tam paredzētiem, speciāliem veterinārajiem līdzekļiem.
- Bieži vien ir sekundāra ādas infekcija, tāpēc veterinārārsti var izrakstīt arī antibiotikas.
- Lai gan ģeneralizētas demodekozes ārstēšana var aizņemt zināmu laiku, tai ir augsts izārstēšanas rādītājs.



Svarīgi

Ir pierādījumi par ģenētisku noslieci, kas nozīmē, ka nedrīkst pavairot individuus ar demodekozi.

VAI ZINĀJĀT?

Pastāv liela iespēja, ka
visi kucēni
vienā metienā saslimst.



Sarkoptiskās kašķa ērces (kašķis)




Pamatinformācija:

- Skar visu vecumu suņus.
- Ļoti lipīga citiem suņiem.
- Iekļūst caur suņa ādas virsējo slāni un izraisa intensīvu niezi.
- Parasti mikroskopiskas un ar neapbruņotu aci grūti vai pat neiespējami atpazīt.

Pazīmes:

- Bezapmatojuma plankumi un niezoša, sarkana āda visbiežāk uz ausu malām, vēdera apakšējās daļas un elkoņiem.
- Pastāvīga kasīšanās.
- Zvīņveidīga āda, īpaši ap ausīm.
- Sekundārās ādas infekcijas.



Kā suņi saslimst ar kašķi?

- No cita suņa (dienas aprūpes centros, suņu parkos un frizētavās).
- Saskare ar invadētu gultas veļu vai kopšanas rīkiem.
- Teritorijās, kurās bieži uzturas inficētas lapsas.

Ārstēšana:


- Apstrādājiēt visus mājdzīvniekus mājās vienlaicīgi.
- Mazgājiēt māju un gultas veļu.
- Mazgājiēt sukas un citus kopšanas rīkus.

Kam ir risks saslimt ar kašķi?

Cilvēkiem var rasties ādas izsitumi, kad tie saskaras ar inficētu mājdzīvnieku.

VAI ZINĀJĀT?

Kašķis ir viens no visbiežāk sastopamajiem suņu **niezei raksturīgajiem iemesliem.**⁸



Uti



Pamatinformācija:

- **Pārnēsā lenteni.**
- Parasti slimo jauni, veci vai novārtā pamesti mājdzīvnieki, kas dzīvo sliktos sanitāros apstākļos.
- Mājdzīvnieki nevar iegūt utis no cilvēkiem vai otrādi.

Kā mājdzīvnieki iegūst utis?

- No citiem mājdzīvniekiem.
- No kopšanas rīkiem, guļvietas.

Kā zināt, vai Jūsu mājdzīvniekam ir utis?

- Raksturīgi: **olas vai gnīdas pielīp pie matiem**, var sajaukt ar blaugznām.
- Pašķirot apmatojumu redzamas gnīdas (sezama sēklas lieluma, brūnā krāsā).
- Kasīšanās.
- Rupjš, sauss vai nespodrs apmatojums.
- Matu izkrišana, īpaši ap ausīm, kaklu, pleciem, cirkšņiem un taisnās zarnas rajonā.
- Nemiers.



Ārstēšana:

- Vienā mājdzīvniecībā visus mājdzīvniekus ārstējiet vienlaicīgi.
- Mazgājiet guļvietu, pavadas un kakla siksnas karstā ūdenī.
- Tīriet visas zonas, kur mājdzīvnieki pavada laiku.
- Atkārtojiet ārstēšanu ar regulāriem intervāliem vienu mēnesi vai ilgāk, ja nepieciešams.
- Ja nepieciešams, noskuj invadēto kažoku.

VAI ZINĀJĀT?

Pastāv **divu veidu utis**: vienas no tām kož ādā, bet otras sūc asinis.



FYPRYST[®]
combo




Parazīti, kas dzīvo mūsu mājdzīvniekos (tārpi)

Mājdzīvnieki ir zinātkāri dzīvnieki, kas ar **degunu** un **muti** pēta pasauli, tāpēc ir neizbēgami, ka kādā dzīves posmā viņi invadēsies ar tārpiem.

Par kuriem tārpiem Jums vajadzētu uztraukties?

- Zarnu tārpi (apaļtārpi, āķtārpi, lenteņi, matgalvji).
- Ar zarnām nesaistīti tārpi (plaušu tārpi, sirdstārpi, acu tārpi un ādas tārpi).

Jūsu mājdzīvnieka **dzīvesveids** bieži nosaka, kuru parazītu invāzijas risks ir vislielākais.



Dehinel® Dehinel®Plus Dehinel®PlusXL

Āķtārpi



Pamatinformācija:

- Barojas ar asinīm zarnās.
- Var būt letāls iznākums, īpaši jaunākiem mājdzīvniekiem.
- Inficēto mājdzīvnieku izkārnījumos izdalās āķtārpu oļņas.

Kā mājdzīvnieki iegūst āķtārpus?

- Caur ādu (kāpuri var iekļūt jūsu mīluļa ķepās).
- Ēdot kāpurus no augsnes.
- Ēdot inficētu grauzēju vai putnu.
- Ar mātes pienu.

Pazīmes:

- Caureja (var būt asiņaina) vai tumši izkārnījumi.
- Zems enerģijas līmenis.
- Apetītes zudums.
- Neizskaidrojams svara zudums.
- Anēmija, kas izpaužas kā bālas smaganas.

Kā Jūs varat inficēties ar āķtārpiem?

- Staigājot basām kājām pa piesārņotu teritoriju.
- Nejauši norijot kāpurus.

Ārstēšana:

- Apstrādāiet mājdzīvnieku ar attārpošanas līdzekļiem vismaz divas reizes ar 2-3 nedēļu starplaiku.

VAI ZINĀJĀT?

Pat ja mājdzīvnieks ir inficēts, Jūs varat neredzēt āķtārpus viņa izkārnījumos.



Apaļtārpi



Pamatinformācija:

- Visbiežāk sastopamie tārpi.
- Var smagi ietekmēt kucēnus un kaķēnus.
- Dzīvo zarnās.
- Dienā izdēj līdz 250 000 olu, kas izdalās ar mājdzīvnieka izkārnījumiem.
- Olas izdzīvo vidē (parkos, dārzos, pagalmos, pastaigu takās) un ir infekciozas vairākus gadus.

Kā mājdzīvnieki iegūst apaļtārpus?

- Kucēni un kaķēni var piedzimt ar šo infekciju vai inficēties ar mātes pienu zīdīšanas laikā.
- Nejauša apaļtārpu olu norīšana no augsnes, smilšu bedrēm un pakaišu kastēm.
- Ēdot termiski neapstrādātu gaļu vai grauzējus/putnus, kas satur tārpu kāpurus.
- Olu ienešana iekšējās uz apaviem vai apģērba.

Jūs varat inficēties ar apaļtārpiem:

- Apstrādājot mājdzīvnieka kažoku vai izkārnījumus.
- Ar nepareizi nomazgātiem pārtikas produktiem, kas inficēti ar olām.
- Ar augsni, strādājot dārzā vai bērniem, kad tie spēlējas ārā.



32

Sezona:

- Visu gadu.

Pieaugušiem mājdzīvniekiem bieži vien infekcijas pazīmes neparādās, bet Jūs varat pamanīt:

- Enerģijas trūkums.
- Caureja vai aizcietējums.
- Svara zudums, neskatoties uz normālu vai paaugstinātu apetīti.
- Vemšana.
- Pārmērīgi liels vēders.
- Maza izmēra kucēni un kaķēni atbilstoši to vecumam.
- Klepus.

Ārstēšana: vismaz divas attārpošanas ar 10-21 dienas starplaiku.

VAI ZINĀJĀT?

Apaļtārpi
var izraisīt
aklumu.



33

Lenteņi



Jūsu mājdzīvnieku var inficēt vairāku veidu lenteņi: visbiežāk sastopamie ir blusu lenteņi, lapsu lenteņi, suņu lenteņi, liellopu lenteņi, cūkas lenteņi un citi.

Pamatinformācija:


- Dzīvo zarnās.
- Biežāk sastopams pieaugušiem mājdzīvniekiem.

Kā mājdzīvnieki iegūst lenteņus?

- Norijot inficētas blusas kopšanas laikā.
- Medību laikā.
- Ēdot termiski neapstrādātu gaļu vai subproduktus (aitas, liellopi).
- Zaķu un grauzēju medībās.

Bieži vien var nebūt pamanāmu simptomu vai arī varat novērot:

- Šļūkšana uz dibena.
- Pārmērīga anālās atveres tīrīšana vai mazgāšana.
- Vemšana.
- Caureja.
- Lenteņu segmenti Jūsu mājdzīvnieka izkārnījumos vai pakaišos (izskatās pēc rīsu graudiņiem).
- Svara zudums, neraugoties uz normālu vai lielāku uzturu daudzumu.



Kas ģimenē ir pakļauts riskam?

- Daži lenteņi, kas inficē mājdzīvniekus, var izraisīt nopietnas slimības arī cilvēkiem. Cilvēki inficējas, norijot olas, kuras var atrast augsnē vai uz dārzeņiem. Bērni ir īpaši pakļauti riskam, jo viņi ir ciešā kontaktā ar mājdzīvniekiem.

Kā atbrīvoties no lenteņa?

- Parasti pietiek ar vienu ārstēšanu.
- Blusu kontrole ir svarīga, jo blusas var pārnēsāt lenteņi.

VAI ZINĀJĀT?

Kaķi, tīrot kažoku, norij aptuveni **50% no blusām**, kas atrodas uz viņu kažoka.



Matgalvji



Pamatinformācija:

- Mazi, suņiem atrasti zarnu tārpi.
- Olas, kas izdalās ar dzīvnieka izkārnījumiem, vidē saglabājas līdz pat septiņiem gadiem.

Kā suņi invadējas ar matgalvjiem?

- Ēdot netīrumus vai mājdzīvnieku izkārnījumus vai pavadot laiku piesārņotā vidē, piemēram, suņu parkā vai pat savā pagalmā.

Kā uzzināt, vai Jūsu sunim ir matgalvji?

Dažiem suņiem nav pazīmju, bet varat novērot:

- Caureju.
- Asiņainus izkārnījumus.
- Svara zudumu.
- Atkārtotu vājumu.

Ārstēšana?

- Ieteicams mājdzīvnieku ārstēt 3 mēnešus pēc kārtas.

VAI ZINĀJĀT?

Matgalvju olas augsnē ir gandrīz **neiespējami** nogalināt vai augsni nav iespējams attīrīt.



Plaušu tārpi kaķiem



Pamatinformācija:

- Var izraisīt nopietnus, dzīvībai potenciāli bīstamus plaušu bojājumus.
- Var būt nopietni kaķēniem, vecākiem kaķiem un kaķiem ar novājinātu imūnsistēmu.
- Var izdalīties ar kaķa ekskrementiem, inficējot vidi.

Kā kaķi inficējas ar plaušu tārpiem?

- Ēdot inficētus gliemežus vai gliemjus.
- Ēdot citus dzīvniekus, kas ēduši inficētus gliemežveidīgos (putnus, grauzējus).



Pazīmes:

Simptomi ir līdzīgi citiem izplatītiem plaušu stāvokļiem, piemēram, kaķu astmai vai pneimonijai:

- Vieglas līdz vidēji smagas pakāpes hronisks klepus.
- Šķaudīšana.
- Elpas trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana.
- Svara zudums.
- Izdalījumi no deguna.

Ārstēšana:

- Ārstēšanas mērķis ir likvidēt parazītu un ārstēt iekaisumu.

Plaušu tārpi suņiem



Pamatinformācija:

- Tiek lēsts, ka gandrīz 1 no 10 inficētajiem suņiem mirst.
- Plaušu tārpi caur suņa ķermeni migrē uz plaušām un sirdi.
- Plaušu tārpi izraisa hronisku slimību, kas var ilgt mēnešiem un pat gadiem.
- Tie biežāk sastopami jaunākiem suņiem.

Kā suņi inficējas ar plaušu tārpiem?

- Ēdot gliemežus vai gļotu takas, gliemjus, vārdes, grauzējus vai putnus, kas pārnēsā plaušu tārpus.
- Zāles ēšana.
- Dzeršana no pelņiem vai āra ūdens tvertnēm.
- No suņu āra rotaļlietām.

Sezona:

Gliemežveidīgo aktivitātes sezonā - mitros apstākļos, vismaz 13 grādu temperatūrā.

Profilakse:

- Uz nakti suņa rotaļlietas un bļodas turiet telpās.
- Barojiet suni telpās.
- Regulāri tīriet ūdens bļodas, kas tiek turētas ārā.
- Vienmēr savāciet suņa izkārnījumus un izmetiet tos drošā veidā.
- Plaušu tārpu profilakse jāveic katru mēnesi.



Plaušu tārpu infekcijas **pazīmes** suņiem var būt ļoti atšķirīgas:

- Pastāvīgs klepus, sēkšana, apgrūtināta elpošana.
- Zems enerģijas līmenis.
- Slikta apetīte.
- Neizskaidrojams svara zudums.
- Vemšana, caureja.
- Neiroloģiskas problēmas (krampji).
- Problēmas ar asins recēšanu (asinis urīnā, vemšana ar asinīm un asins plankumi uz smagām).

Ārstēšana:

- Smagos gadījumos ārstēšana var ilgt vairākas nedēļas vai mēnešus.
- Veterinārārsts var izrakstīt zāles iekaisuma ārstēšanai.



VAI ZINĀJĀT?

Tiek uzskatīts, ka vidēji Lielbritānijas dārzā ir vairāk nekā **20 000 gliemežu un gliemju⁹**, no kuriem katrs var būt plaušu tārpa kāpuru pārnēsātājs.



Sirdstārpi




Pamatinformācija:

- Pārnēsā moskīti/odi.
- Viens no bīstamākajiem parazītiem, kas izraisa ilgstošus plaušu, sirds un asinsvadu bojājumus.
- Viegli novērst, bet grūti un dārgi ārstēt.
- Inficēties var arī kaķi.

Ods, kožot inficētam sunim, uzņem mikrofilārijas.

Odā mikrofilārijas attīstās par infekciozās stadijas kāpuriem.



Kā zināt, vai sunim ir sirdstārpi?

Pēc inficēta oda kodiena var paiet pat seši mēneši, līdz parādās jebkādas pazīmes:

- Klepus, īpaši pēc paaugstinātas aktivitātes.
- Parastās darbības (pastaigas vai rotaļas) Jūsu sunim sagādā grūtības.
- Samazināta apetīte, kas izraisa svara zudumu.
- Elpas trūkums.
- Uzpūties vēders.
- Miegainība.


Profilakse:

- Lietojiet ikmēneša profilaktisko līdzekli pret sirdstārpiem.
- Lietojiet moskītu/odu **repelentus**.
- Samaziniet moskītu/odu iedarbību.

Ārstēšana:

- Ārstēšana ir sarežģīta un veiksmīgāka, ja invāzija tiek diagnosticēta agrīni.
- Mājdzīvnieka ārstēšanas fāzē ir svarīgi, lai suns tiktu turēts pēc iespējas mierīgākos apstākļos un tam būtu ierobežota fiziskā aktivitāte.

Vesela sirds, daudz mīlestības!



Zemādas tārpi



Pamatinformācija:

- Pārnēsā moskīti/odi.
- Var inficēties suņi un kaķi.
- Var inficēties arī cilvēki.

Visbiežāk sastopamās zemādas tārpu infekcijas pazīmes:

- Nesāpīgi mezgliņi zem ādas.
- Nieze.
- Ādas apsārtums.
- Matu izkrišana.

Ārstēšana:

- Ārstēšana ir pieejama.
- Dažreiz ir nepieciešams ķirurģiski noņemt mezglus.



Žirardija



Pamatinformācija:

- Inficēšanās notiek ar piesārņotu ūdeni.
- Dzīvo suņa zarnās.
- Var pārnest uz cilvēkiem.
- Ļoti izplatīts caurejas cēlonis suņu vidū.
- Visbīstamākais kucēniem un vecākiem suņiem.
- Parazīts iekapsulējas cietā apvalkā suņa zarnās un ar izkārnījumiem nonāk apkārtējā vidē.

Pazīmes:

- Caureja.
- Vemšana.
- Svara zudums.
- Zems aktivitātes līmenis.

Kā samazināt iespēju, ka Jūsu suns inficējas ar žirardiju?

- Vienmēr piedāvāiet tīru, drošu dzeramo ūdeni.
- Regulāri tīriet rotaļlietas, ūdens un barības bļodas.
- Neļaujiet sunim dzert no ūdens bļodām sabiedriskās vietās.
- Savāciet un izmetiet suņa izkārnījumus.

Ārstēšana:

- Ārstēšana parasti ilgst 3-10 dienas.
- Ieteicams bieži mazgāt savu mīluļi, īpaši pēc izkārnīšanās, lai noņemtu žirardijas cistas no tā apmatojuma.

VAI ZINĀJĀT?

Žirardijas cistas var izdzīvot aukstā ūdenī vai augsnē **vairākus mēnešus.**



Leišmanioze



Pamatinformācija:

- Vidusjūras reģionā izplatīta slimība.
- Izplatās ar **smilšu mušām**, kas iekož vairākas reizes un dzer asinis.
- Var ietekmēt iekšējos orgānus, tostarp aknas, nieres un kaulu smadzenes.

Visbiežāk sastopamie simptomi:

- Ādas problēmas (krevelāini bojājumi, apmatojuma izkrišana) ap suņa purnu, ausīm, acīm un uz ceļgaliem un elkoņiem.
- Nagu un ķepu bojājumi (gari, trausli nagi, kas aug ātrāk nekā parasti).
- Apetītes zudums, svara zudums.
- Hroniska caureja.
- Pietūkušas locītavas vai kājas.
- Drudzis.

Profilakse:

- Vakcinācija.
- Kukaiņu atbaidīšanas līdzekļu (repelentu) lietošana.
- Izvairieties no vakara pastaigām, jo īpaši mežainās vietās, parkos un dārzos.

Ārstēšana:

- Ārstēšanas mērķis ir klīnisko pazīmju novēršana.
- Diemžēl ir iespējams recidīvs.


Leišmanioze nav ārstējama, tāpēc ārstēšanas mērķis ir novērst slimības pazīmes.

Ataxxa®

Šķīdums pilināšanai uz ādas **aktīviem** suņiem



NELIETOT KAĶIEM!



Biežāk uzdotie jautājumi par parazītiem

→ Vai es varu lietot tās pašas veterinārās zāles suņiem un kaķiem?

Nekad nav laba ideja suņiem un kaķiem lietot vienas un tās pašas zāles. Kaķi uz noteiktiem medikamentiem reaģē citādi nekā suņi, jo tiem ir atšķirīga vielmaiņa. Daži suņiem paredzētie līdzekļi pret blusām un ērcēm satur vielas, kas ir toksiskas kaķiem. Gadījumā, ja Jūs kādreiz kaķim jau esat devis suņiem paredzētu līdzekli, vislabāk būtu nekavējoties sazināties ar savu veterinārārstu.

→ Vai es varu mazgāt suni pirms vai pēc pretparazitārā līdzekļa uzklāšanas uz ādas?

Vispārējs noteikums, ko varat ievērot, ir tāds, ka 48 stundas pirms un pēc līdzekļa lietošanas uz ādas nevajadzētu mazgāt savu mīluļi. Precīzs laiks ir norādīts konkrētā līdzekļa lietošanas instrukcijā.

→ Ja mans mājdzīvnieks pēc tabletes apēšanas vemj, vai tā joprojām darbosies?

Perorāli lietotas zāles parasti uzsūcas 20-30 minūšu laikā. Ja Jūsu dzīvnieks pēc tam vemj, zāles, iespējams, jau ir uzsūkušās. Jūs varat pārbaudīt, vai atvertajās masās ir redzama tablete, ja tā ir redzama, tas nozīmē, ka tablete nav uzsūkusies. Jebkurā gadījumā vislabāk ir sazināties ar savu veterinārārstu.

→ Vai manam mājdzīvniekam ziemā ir nepieciešama aizsardzība pret parazītiem?

Jā. Blusas ir problēma arī ziemā, jo tās vairojas vidē un var pārziemot telpās. Ērcu un odu sezona var sākties agri pavasarī un turpināties līdz pat vēlām rudenim neparedzamu laikapstākļu dēļ. Apaļtārpi var izdzīvot pat zemā temperatūrā, tāpēc tie ir bīstami visu gadu.

→ Vai mājdzīvnieku aizsardzība pret parazītiem aizsargā arī cilvēkus?

Dažus parazītus dzīvnieki var pārnest uz cilvēkiem, tāpēc ir svarīgi aizsargāt savus mājdzīvniekus. Tas ir īpaši svarīgi ģimenēm ar bērniem, jo viņi bieži nemazgā rokas regulāri, un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu.

→ Vai mājdzīvnieki var inficēties ar parazītiem arī tad, ja tie dzīvo tikai telpās?


Mājdzīvnieki iekštelpās joprojām var inficēties ar parazītiem, jo mēs varam ienest mikroskopiskās oliņas uz apģērba vai apaviem. Jābūt uzmanīgiem arī tad, ja dzīvoklī ir suns, jo citi mājdzīvnieki no viņa var iegūt blusas vai citus parazītus.

→ Kā es varu uzzināt, vai manam mājdzīvniekam ir parazīti?


Daži no visbiežāk sastopamajiem parazītu infekcijas simptomiem ir kasišanās, ādas apsārtums, nemiers, caureja, vēdera uzpūšanās, svāra zudums, klepus, nogurums, blāvs kažoks. Jūsu mājdzīvnieka izkārnījumos var pat parādīties tārpi.

→ Vai kaķu un suņu blusas var dzīvot uz cilvēkiem?



Blusas nedzīvo uz cilvēkiem, jo tās dod priekšroku vairošanās vietām, kur tās var paslēpties, taču blusu kodumi var rasties ikvienam, kas nonāk saskarē ar invadētu mājdzīvnieku vai mājokli. Blusu kodumi izraisa niezošus sarkanos plankumus (īpaši uz potītēm). Blusas var pārnēsāt arī slimības, ko var pārnest uz cilvēkiem.



Ieteikumi veiksmīgai aizsardzībai pret ērcēm un blusām ar Krka risinājumiem

-  Pārbaudiet savu dzīvnieku pēc katras pastaigas.
-  Pirms zāļu lietošanas nosveriet savu mīluļi.
-  Lietojiet savu dzīvnieka sveram atbilstošu pipeti.
-  Nemazgājiet savu suni 2 dienas pirms un 2 dienas pēc zāļu uzpildināšanas.
-  Lietojiet zāles dzīvniekam pirms gulētiešanas.
-  Atplēšiet iepakojumu perforācijas vietā un izņemiet pipeti tieši pirms zāļu lietošanas.
-  Ar pipetes vāciņu pārduriet tās aizdari.
-  Pagaidiet, līdz jūsu dzīvnieks nomierinās un stāv mierīgi.
-  Starp lāpstiņām pašķīriet apmatojumu, līdz kļūst redzama āda.
-  Pielieciet pipetes galu pie ādas un vairākas reizes saspiediet pipeti.
-  Lieliem suņiem uzpildiniet zāles uz muguras 3-4 vietās.
-  Pilnībā izspiediet pipeti. Nelietojiet vienu pipeti vairākiem mājdzīvniekiem.
-  Neaiztieciet kažoku kamēr aplikācijas vieta nav sausa.
-  Lietojiet zāles visiem māsaimniecībā esošajiem mājdzīvniekiem.
-  Neaiztieciet aplikācijas vietu ar roku.
-  Atzīmējiet ārstēšanas laiku un atkārtojiet pēc 1 mēneša.

Ieteikumi, lai atvieglotu Jūsu dzīvī aizsardzībai pret iekšējiem parazītiem ar Krka tabletēm

-  Regulāri attārpojiēt savu mīluļi.
-  Pirms lietošanas nosveriet savu mīluļi.
-  Lietojiet savu dzīvnieka sveram atbilstošu tableti.
-  Atrodiet drošu un mierīgu vietu.
-  Dodiet savam mīluļim tā iecienītāko barību, lai to atalgotu un atvieglotu procesu nākotnē.
-  Vajadzības gadījumā lūdziet palīdzību.
-  Izmantojiet tablešu devēju. Uzmanieties, lai neievainotu mājdzīvnieku.
-  Nolieciet mājdzīvnieka galvu pāri plecam.
-  Ātri ievietojiet tableti pēc iespējas tālāk virs mēles.
-  Pārbaudiet savu mājdzīvnieka muti, lai pārliecinātos, vai tas ir norijis tableti.
-  Ja jūsu mājdzīvniekam nav alerģijas, varat mēģināt paslēpt tableti garšīgā barībā.
-  Pēc lietošanas nomazgājiet rokas.
-  Lietojiet zāles visiem māsaimniecībā esošajiem mājdzīvniekiem.
-  Atzīmējiet kalendārā lietošanas datumu un atkārtojiet apstrādi pēc ieteiktā laika.

Kā cīnīties ar mājdzīvnieka parazītiem?¹⁰

IEKŠĒJIE PARAZĪTI (tārpi)

PIEAUGUŠIE

Vispārējs ieteikums: 4 reizes gadā

Augsta riska scenārijs: 4-12 reizes gadā



Bērni, seniori, hroniskas slimības



Ēd jēlu gaļu, subproduktus



Ēd medijumu



Dzīvo brīvā dabā



Ēd neēdamas lietas



Odu sezona



Darba suņi (policija, militārais dienests, glabēji, terapija)



Konkursi, izstādes

KUCĒNI UN KAĶĒNI



2 nedēļas

4 nedēļas

6 nedēļas

8 nedēļas

2 mēnešu vecums

JAUNAS MĀJAS

Katru mēnesi līdz 6 mēnešu vecumam



3 nedēļas

5 nedēļas

7 nedēļas

2 mēnešu vecums

Katru mēnesi līdz 6 mēnešu vecumam

ĀRĒJIE parazīti (blusas, ērces utt.)





BLUSAS
Katru mēnesi



ĒRCES
Katru mēnesi, kad āra temperatūra ir virs par 5°C

Atsauces

1. Vets now: How do I create a dog friendly home? [Internet]. Available from: <https://www.vets-now.com/pet-care-advice/dog-proof-your-house/> Accessed 21 November 2022.
2. Montoya M, Morrison JA, Arrignon F et al. Life expectancy tables for dogs and cats derived from clinical data. Front Vet Sci. 2023 Feb 21;10:1082102. doi: 10.3389/fvets.2023.1082102. PMID: 36896289; PMCID: PMC9989186.
3. Kovalkovičova N, Sutiakova I, Pistl J, Sutiak V. Some food toxic for pets. Interdiscip Toxicol. 2009 Sep;2(3):169-76. doi: 10.2478/v10102-009-0012-4. Epub 2009 Sep 28. PMID: 21217849; PMCID: PMC2984110.
4. Poisonous Plants. Toxic and Non-Toxic Plants List. <https://www.aspc.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants>. Accessed 21 November 2022.
5. Cunha E, Tavares L, Oliveira M. Revisiting Periodontal Disease in Dogs: How to Manage This New Old Problem? Antibiotics. 2022; 11(12):1729. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11121729>.
6. ESCCAP. Control of ectoparasites in dogs and cats. Guideline 03, Seventh Edition. [Internet]. January 2022. ISBN: 978-1-913757-15-1. [Cited: 27. 2. 2024]. Available from: https://www.esccap.org/uploads/docs/cgqtqpf1_0720_ESCCAP_GL3_English_v19_1p.pdf.
7. Jochen Suss, Christine Klaus, Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe, Peter C. Werner, What Makes Ticks Tick? Climate Change, Ticks, and Tick-Borne Diseases, Journal of Travel Medicine, Volume 15, Issue 1, 1 January 2008, Pages 39–45, <https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2007.00176.x>
8. Bruet V, Mosca M, Briand A et al. Clinical Guidelines for the Use of Antipruritic Drugs in the Control of the Most Frequent Pruritic Skin Diseases in Dogs. Vet. Sci. 2022; 9, 149. <https://doi.org/10.3390/vetsci9040149>.
9. Guide to slugs and snails: how to identify common species and protect your plants <https://www.countryfile.com/wildlife/insects-invertebrates/guide-to-britains-slugs-and-snails-how-to-identify-common-species-andprotectyour-plants> Accessed 20 february 2024.
10. ESCCAP. Worm control in dogs and cats. Guideline 01, Sixth Edition. [Internet]. May 2021. ISBN: 978-1-913757-18-2. [Cited: 27. 2. 2024]. Available from: https://www.esccap.org/uploads/docs/oc1bt50t_0778_ESCCAP_GL1_v15_1p.pdf.

Neaizmirstiet! Tas, ka Jūs neredzat, nenožīmē, ka viņu nav.

50

51

IZVĒLIETIES KRKA PRETPARAZITĀROS LĪDZEKĻUS



LAI JŪSU MĀJDZĪVIEKS IR VESELS!

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju un veterināro zāļu uzglabāšanas nosacījumus. Konsultējieties ar savu veterinārārstu par riskiem un blakusparādībām.

NO **GĀLVAS**
līdz **ASTEI**

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles. Pārskatīšanas datums: 09.2025.

Lūdzu, iepazīstieties ar pilnu zāļu aprakstu (www.pvd.gov.lv) pirms zāļu izrakstīšanas. Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:



SIA KRKA Latvija, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Tālrunis 67338610, info.lv@krka.biz, www.krka.lv